

## STELLINGEN

1. Klinisch niet-functionerende en gonadotrofe hypofyseadenomen vormen één klinische groep.
2. Langdurige therapie met dopamine agonisten bij patienten met een klinisch niet-functionerend of gonadotroof hypofyseadenoom zou tot tumorvolumereductie kunnen leiden.
3. Immunocytochemie van tumorweëfsel is een weinig sensitieve methode om de aanwezigheid van hormonen in klinisch niet-functionerende hypofyseadenomen aan te tonen.
4. Gonadotrofine Releasing Hormoon agonisten zijn ongeschikt voor de behandeling van klinisch niet-functionerende en gonadotrofe hypofyseadenomen.
5. De meerderheid van de klinisch niet-functionerende hypofyseadenomen ontstaat naar alle waarschijnlijkheid uit gonadotrofe hypofysecellen.  
(Krenning et al., Lancet 1989;1:242-4)
6. Scanning van endocriene pancreastumoren met behulp van een radioactief gelabeld somatostatine analogon is een nuttige methode om de primaire tumor en eventuele metastasen te localiseren.  
(Kwekkeboom et al., Neth J Med 1986;29:2-4)
7. De vermeend hoge incidentie van tweede tumoren bij patienten met chronisch lymfatische leukemie is voor een groot deel te verklaren uit selectie van de onderzochte groepen patienten.  
(Kwekkeboom et al., Neth J Med 1986;29:2-4)
8. Kruisreactiviteit in immunoassays dient opgegeven te worden in de eenheden waarin de te meten eiwitten worden uitgedrukt.

9. De histologische onderverdeling van kleincellige longcarcinomen volgens de criteria van de World Health Organization heeft geen voorspellende waarde met betrekking tot de overlevingsduur.  
(Hirsch et al., Cancer 1983;52:2144-50)
10. De nog maar al te vaak op menukaarten aanwezige tong picasso symboliseert de burgerlijke opvatting dat aanrommelen met kleuren en smaken tot moderne kunst leidt.
11. Wanneer bij voetbalwedstrijden de agressie op het veld bepalend was voor het gedrag van de supporters, zou elke rugbywedstrijd aanleiding moeten geven tot het leveren van veldslagen.