

STELLINGEN

- I. Er zijn sterke aanwijzingen dat kwashiorkor een gevolg kan zijn van blootstelling aan aflatoxinen.
- II. Bij verdergaand onderzoek betreffende de seizoensvariatie in geboortegewichten van kinderen in de tropen, is het noodzakelijk de rol van aflatoxinen in deze te beschouwen.
- III. Gezien het belang van klimatologische data bij de bestudering van voedingsgerelateerde ziekten, dienen deze gegevens dan ook vermeld te worden. Op een zulke wijze zal dan duidelijk zijn of verschillende onderzoeken al dan niet vergelijkbaar zijn.
- IV. Indien in de tropen autopsie wordt verricht, dient een deel van de lever te worden onderzocht op de aanwezigheid van aflatoxinen.
- V. Kinderen en volwassenen in de tropen eten vaak voedsel dat in mycotoxicologisch opzicht in Nederland ongeschikt zou worden geacht voor dierlijke consumptie.
- VI. Intraperitoneale bloedtransfusie ter bestrijding van een chronische anaemie bij kinderen in de tropen is een veilige en effectieve methode. (van Bommel en de Vries, Tropical Doctor, 1988;18;89-91)
- VII. De behandeling van congenitale knieluxatie dient conservatief te zijn middels redresserende verbanden. (de Vries, Annals of Trop. Paed., 1987;7:259-261)
- VIII. De kortste weg is de weg die men kent. (Kikuyu spreekwoord)
- IX. Het percentage doodgeboorten in tropische ziekenhuizen is een goede maat voor de perinatale sterfte in dit gebied. (Voorhoeve, Sozialpädiatrie, 1989;11:35-37)
- X. De opleiding tot orthopaedisch chirurg is niet meer gediend met een twee-jarig gedeelte heelkunde-B.
- XI. Om grootheid van mensen te meten is centimeters een slechte maat.