

STELLINGEN

1. Adrenaline verhoogt de afgifte van noradrenaline door stimulatie van perifere postganglionaire presynaptische beta receptoren.
[dit proefschrift]
2. Toediening van selectieve beta-2 agonisten heeft beta-1 receptor gemedieerde effecten tot gevolg.
[dit proefschrift]
3. Overproductie van adrenaline is een van de pathogenetische factoren bij essentiële hypertensie.
[dit proefschrift]
4. Om de lithium-klaring als maat voor proximale tubulaire reabsorptie te kunnen hanteren dienen ook de glomerulus filtratiesnelheid en de uitscheiding van natrium te worden gemeten.
[HH Vincent et al, Lancet 1987; 2: 1406-07]
5. De nephrotoxiciteit van cyclosporine berust primair op een effect van dit middel op de glomerulus.
[HH Vincent et al, Transplant Proc 1988; 20 (Supp 3): 681]
6. Wanneer men plasmaferese toepast bij de behandeling van een snel progressieve glomerulonefritis, dient men niet met vers plasma maar met albumine- en zoutoplossingen te substitueren.
7. Continue arterioveneuze hemodiafiltratie (CAVHD) is de voorkeursbehandeling bij intensive care-patienten met acute nierinsufficiëntie.
8. De associatie van een ziekte met een bepaald HLA-phenotype wordt meestal toegeschreven aan 'linkage-desequilibrium' maar kan ook berusten op de specifieke functie van het HLA-molecuul bij de presentatie van een antigeen.
9. Een nefroloog is vooral een intensivist met verstand van dialyse-behandeling.
10. Met het oog op de verkeersveiligheid dient de betekenis van het rode verkeerslicht te worden veranderd in: verleen voorrang aan alle verkeer.