

STELLINGEN

1. Perinatale hypoxie vergroot de kans op het ontstaan van visuele stoornissen.
2. Herstel van afwijkingen in visuele functies treedt ook na het eerste levensjaar op.
3. De in dit proefschrift beschreven methoden van onderzoek van visuele functies zijn bruikbaar voor "screening" in de eerstelijns-gezondheidszorg.
4. Klinische criteria voor perinatale hypoxie hebben geen voorspellende waarde voor de visuele en neuromotorische ontwikkeling van het individuele kind.
5. Het belangrijkste deel van het visuele systeem bevindt zich achter de oogbol.
6. Verschillen in prevalentie van het tropische splenomegalie syndroom tussen verschillende bevolkingsgroepen in West-Afrika berusten op genetische verschillen.
7. Naast veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen is de aanwezigheid van getrainde artsen, verpleegkundigen en verloskundigen van grote invloed op de morbiditeit en mortaliteit van kinderen in ontwikkelingslanden (Lancet, Oct.20, 1984, pp.912-913)
8. De verstrekking van geneesmiddelen tegen malaria door Village Health Workers aan dorpsgenoten die zeggen koorts te hebben, zal de ontwikkeling van resistentie van Plasmodia tegen dergelijke geneesmiddelen versnellen.

9. De effecten van in de judosport geoorloofde omstrengeling van de hals en de daarbij optredende hypoxie en ischaemie van de hersenen zijn onvoldoende onderzocht om een uitspraak over onschadelijkheid hiervan te kunnen doen.
10. Het gebruik van de Latijnse taal door artsen moet voorbehouden blijven aan degenen die declinaties en conjugaties beheersen.
11. De kracht van de "alternatieve" geneeskunde schuilt in de prijs.
12. Het geven van flesvoeding versterkt de vader-kind binding.

Stellingen behorende bij
het proefschrift van
F.Groenendaal
's Lands Werf 266
Rotterdam