

STELLINGEN

I

Het testen van de contrastgevoeligheid is een gevoelige methode voor het aantonen van visuele functiestoornissen.

II

Het vermogen objecten waar te nemen die zwak gecontrasteerd zijn is een visuele functie die niet m.b.v. de Snellen kaart gemeten kan worden.

III

Bij de ziekte van Parkinson duidt de vermindering van frequentie-selectieve contrastgevoeligheid die tevens afhankelijk is van de stimulus oriëntatie, op een functiestoornis van de primaire visuele cortex.

IV

Dopamine is een functionele transmitter in het visuele systeem.

V

Progressieve visuele functiestoornissen ten gevolge van stuwingspillen kunnen voorkomen zonder verslechtering van de Snellen visus of van de gezichtsvelden.

VI

De behandeling van opticus neuropathie ten gevolge van een onbehandelde hyperthyreoïdie dient te beginnen met antithyreotische medicatie.

VII

Ter voorkoming van herseninfarcten zijn de behandeling van hypertensie en adviezen m.b.t. leefgewoonten bij patiënten met TIA's, belangrijker dan het voorschrijven van aspirine.

VIII

Gezien de ernst van de late complicaties van preventieve hersenbestraling bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom "in totale remissie" is het voor de patient te wensen dat de remissie van beperkte duur is.

IX

De transcраниële Doppler techniek is niet geschikt voor het aantonen van hersenischemie na een subarachnoidale bloeding, omdat vaatspasme slechts een bevorderende voorwaarde van hersenischemie is.

X

De op vroege leeftijd geopenbaarde epilepsie bij Gustave Flaubert heeft een gunstige invloed gehad op zijn schrijverschap.

XI

Gezien het hoge percentage incestueuze handelingen binnen het "traditionele gezin" dienen kunstmatige vormen van voortplanting voorbehouden te worden aan niet traditionele vormen van ouderschap.

Rotterdam, 30 november 1988

C. Bulens