

STELLINGEN

I.

Met een aan de lokale omstandigheden aangepast onderzoeksmodel zoals het COPCORD kan in ontwikkelingslanden relatief goedkoop en efficiënt epidemiologisch onderzoek worden uitgevoerd.

II.

Het feit dat de leeftijdsgestandaardiseerde totale prevalenties voor gewrichts-, nek- en rugklachten ongeveer dezelfde zijn in zich ontwikkelende en in reeds ontwikkelde landen suggereert dat omgevingsfactoren van geringe invloed zijn op deze klachten.

III.

Aangezien het overgrote deel van medisch onderzoek gebaseerd is op vergelijkingen (van groepen) dient in zowel ontwikkelde als zich ontwikkelende landen de methodologie van epidemiologisch onderzoek een onderdeel te zijn van het medisch basiscurriculum.

IV.

Zonder epidemiologische gegevens is het niet mogelijk om de regering van een ontwikkelingsland ervan te overtuigen dat chronische ziekten een volksgezondheidsprobleem zijn.

V.

Het ideaal van de Wereldgezondheidsorganisatie: "Gezondheid voor iedereen in het jaar 2000" is onbereikbaar voor de ontwikkelingslanden.

VI.

In het jaar 2000 zal naar verwachting in Indonesië een gemiddelde leeftijd van 70 jaar bereikt worden. Simultaan met deze vergrijzing zullen de negatieve sociale en economische consequenties van ouderdomsziekten zoals die van het bewegingsapparaat enorm zijn toegenomen. Dit zal een verdere ontwikkeling van het land doen stagneren zo niet ombuigen.

VII.

Indonesië lijdt niet zozeer aan overbevolking als wel aan een ongelijke verdeling van de bevolking over de meer dan dertien duizend eilanden.

VIII.

Het in sommige ontwikkelingslanden op de vrije markt beschikbaar zijn van geneesmiddelen die kunnen leiden tot ernstige bijwerkingen vereist herbezinning van de lokale gezondheidsautoriteiten.

IX.

De lage prevalentie van reumatoïde artritis in sommige ontwikkelingslanden is eerder het gevolg van oversterfte dan van een lage incidentie.

X.

Het relatief frequent voorkomen van jicht en hyperuricaemie bij Javanen is hoogstwaarschijnlijk erfelijk bepaald.

XI.

Een maagzweer veroorzaakt door niet-steroidale anti-inflammatoire geneesmiddelen vertoont belangrijke verschillen met de klassieke maagzweer.

XII.

Mensen in de tropen hebben minder last van pijn en stijfheid dan mensen in een koud klimaat.

Stellingen behorende bij het proefschrift van J. Darmawan:

"Rheumatic conditions in the northern part of Central Java.
An epidemiological survey".

Rotterdam, 16 november 1988.