

STELLINGEN

I

De gegevens verkregen uit de anamnese en het fysische onderzoek van een patiënt met "anterior knee pain" klachten of patellofemorale klachten zijn onvoldoende om de diagnose plica syndroom te kunnen stellen.

II

Bij onbegrepen "anterior knee pain" klachten of patellofemorale klachten is een ultrasonografisch onderzoek van de patellofemorale ruimte geïndiceerd om de aanwezigheid van een plica synovialis in de knie vast te stellen.

III

Verwijdering van een plica synovialis biedt geen voordelen boven het niet verwijderen van een plica synovialis.

IV

De retropatellaire wrijftest bij het fysische onderzoek van de knie geeft geen nadere informatie omtrent het wel of niet aanwezig zijn van chondromalacie patellae of een plica synovialis.

V

Indien, bij arthroscopie van een knie, een plica synovialis wordt aangetroffen tegelijk met chondromalacie van de patella dan is verwijdering van de plica geen garantie voor een goed klinisch resultaat.

VI

Het probleem van loslating van protheses zal pas opgelost kunnen worden als het materiaal, waarvan de prothese gemaakt wordt, biocompatibel is en dezelfde elastische eigenschappen vertoont als levend botweefsel.

VII

Een operatieve "plastiek" van de voorste kruisband in de knie dient bij voorkeur te geschieden met "lichaams-eigen" materiaal.

VIII

Een achterste spondylodesis van de wervelkolom bij degeneratieve afwijkingen van die wervelkolom is alleen geïndiceerd en nuttig als er sprake is van degeneratieve afwijkingen op één vlak en indien een delordoserend proefgips met pijp, gedurende 6 weken gedragen door de patiënt, volledige verlichting van de klachten heeft gegeven.

IX

De voorkeursbehandeling van een mediale collumfractuur van het femur is een osteosynthese met 2, Hansson Hook "pins".

X

Het plaatsen van een ongecementeerde totale heupprothese bij patiënten, jonger dan 50 jaar, met een coxarthrose dient voorlopig als experimentele geneeskunde beschouwd te worden.

XI

Als de norm van het norm inkomen de "haagse" norm is, dan kan met recht gesproken worden van een "abnormale" norm.

XII

Sport dreigt te verloederen inplaats van te verbroederen.

Stellingen behorend bij het proefschrift van W.H.J.Derks. Het plica syndroom van de knie. Een klinisch onderzoek.