

#### Stellingen.

- Na een laparotomie dient de buikwond bij voorkeur gesloten te worden met monofilament resorbeerbaar hechtmateriaal dat pas laattijdig zijn treksterkte verliest.
- Het voorkomen van een wondinfectie na een buikoperatie is een van de belangrijkste factoren in de preventie van littekensbreuken.
- Een chirurg die zegt weinig littekensbreuken te zien, kijkt zijn patiënten niet goed na.
- Een éénmalige pre-operatieve toediening van antibiotica als profylaxe van wondinfecties bij abdominale ingrepen is voldoende.
- Ook bijgraad 4 haemorrhoiden verdient de laterale interne sfincterotomie als behandeling de voorkeur boven de klassieke haemorrhoidectomie.
- De percutane endoscopische gastrostomie is een elegante therapie bij patiënten die langdurig een maagsonde nodig zouden hebben.
- Met een per-operatieve angiografie kunnen vele postoperatieve complicaties na femoro-distale reconstructies voorkomen worden.
- Operatieve therapie voor radiuskopfrakturen is veelal overbodig.
- Bij de zuggurtungsosteosynthese heeft het gebruik van Vicryl<sup>R</sup> 2.0 voordeelen boven het gebruik van een metalen cerclagedraad.
- Ernstig weke delen letsel van extremiteiten rechtvaardigt kortdurende immobilisatie van de gewrichten met behulp van een fixateur externe.
- In het kader van de budgettering is het voorzien van complicaties veel effectiever dan het korten van de opnameperiode.
- De perifere kliniek dient als opleidingsinstituut voor co-assistenten gehandhaafd te worden.
- De toekomst van de chirurgie in Nederland is aan de vrouw.

