

## STELLINGEN

1. Een éénmalige volume bloeddorstromingsmeting verricht in de foetale aorta descendens is voor de beoordeling van de foetale toestand van generlei betekenis.
2. Ten tijde van transplacentaire behandeling van foetale tachyritmie bieden volume bloeddorstromingsmetingen in de foetale aorta descendens essentiële informatie over de effectiviteit van de behandeling.
3. Bij intrauteriene groeivertraging zijn herhaalde metingen van de maximale bloedstroomsnelheid in de foetale aorta descendens voor de beoordeling van de foetale toestand superieur aan registraties van de foetale hartfrequentie.
4. Normale bloedstroomsnelheidswaarden in de foetale aorta descendens, arteria carotis interna en arteria umbilicalis zijn bij ernstige intrauteriene groeivertraging suggestief voor de aanwezigheid van een foetaal chromosomaal of structureel defect.
5. Er dient op zo kort mogelijke termijn een aparte honorering te komen voor prenatale echoscopische diagnostiek van aangeboren afwijkingen. Er dient meer inzicht te worden verkregen in het natuurlijke beloop van bepaalde prenataal vastgestelde foetale structurele afwijkingen.
6. Om veilig gebruik van medisch-diagnostische ultrageluidsapparatuur te waarborgen dient een aantal ter zake relevante eigenschappen van deze apparatuur op de apparatuur zelf te worden gespecificeerd.  
(Advies inzake Ultrageluid uitgebracht door een commissie van de Gezondheidsraad).
7. Wanneer met behulp van real-time echoscopie een normaal 4-kamer beeld wordt waargenomen, heeft men daarmee ongeveer 80% van de aangeboren hartafwijkingen uitgesloten.
8. De transcutane transvesicale follikelpunctie is een obsoleete procedure voor het verzamelen van oocyten binnen het IVF programma.
9. Het is ongewenst een prenatale diagnose in het eerste trimester in gekweekte chorion villi te verrichten, wegens het risico van maternale contaminatie, terwijl de resultaten van de directe methode betrouwbaar zijn.  
(E.S. Sachs, M.G.J. Jahoda, R.P.L. Vosters, W.J. Kleijer, H. Galjaard.  
Ned. Tijdschrift Geneeskunde 1985, 129:1968-74).
10. Het biofysisch profiel meet wel veel, maar staat ver af van de holistische verloskunde.

11. Men dient terughoudend te zijn met het verrichten van serologisch onderzoek naar HIV dragerschap tijdens de zwangerschap.
12. Bij de behandeling van ovarium carcinoom zal in vergelijking met enkelvoudige chemotherapie, de toepassing van combinatie chemotherapie de prognose op lange termijn niet verbeteren.
13. Er zijn meer dan vijftig erkende methoden tot behandeling van het temporo-mandibulaire gewrichts syndroom. De etiologie en pathofysiologie van deze aandoening zijn echter nog deels onbegrepen.
14. Het is juister aan de linker zijde van de weg te rijden dan aan de rechter zijde.

Rotterdam, 14 januari 1987

H.M. Tonge