

STELLINGEN

1. Alle patienten, die een bovenbuiksoperatie ondergaan, dienen pre- en post-operatief ademhalingsoefeningen te krijgen.
2. Bij patienten zonder pulmonale klachten is preoperatief longfunctieonderzoek overbodig.
3. Radiotherapie voor niet bewezen parasternale metastasering van het mammacarcinoom dient te worden afgeschaft.
4. Een vrolijk hart bevordert de genezing maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

Spreuken 17: 22

5. Pancreatico duodenectomie als behandeling van het pancreascarcinoom is vrijwel nooit geïndiceerd.
6. Intraperitoneale chemotherapie ter behandeling van gastro-intestinale tumoren is vooralsnog weinig succesvol door het ontbreken van effectieve cytostatica.
7. Het achterwegelaten van nutteloos onderzoek bij de follow-up van patienten behandeld voor mammacarcinoom kan jaarlijks een besparing van vele miljoenen guldens opleveren.

(E.J.T. Rutgers, dissertatie 1986)

8. De vooruitgang in de behandeling van kankerpatienten vraagt om grotere bescheidenheid van alle oncologen.
9. Als primaire behandeling van de ingegroeide en geïnfecteerde teennagel verdient chemische cauterisatie van het nagelbed met phenol de voorkeur.
10. Osteosynthese van de ongecompliceerde middiaphysaire claviculafractuur is een niet ongevaarlijk modeverschijnsel.
11. Drainage van het galblaasbed na cholecystectomie is als routine maatregel niet geïndiceerd.
12. Gezien de omgangsvormen in de gezondheidszorg beschouwen velen de begrippen autoriteit en autoritair als synoniemen.