

STELLINGEN

1. Geen enkele granulosa cel tumor kan op histologische gronden als benigne worden beschouwd, aangezien benigne granulosa celtumoren niet bestaan.
2. Flow-cytometrie kan van betekenis zijn bij de differentiële diagnose en gradering van granulosa cel tumoren.
3. Immunohistochemische kleuring van steroïden in coupes van in paraffine ingebed tumorweefsel is van beperkte betekenis.
4. Verhoogd AFP in het serum sluit de diagnose "sexcord-stromal" tumor van het ovarium niet uit.

Chadha, Honnebier en Schaberg
Int. J. Gynecol. Pathol (1987) 6: 82-88.

5. Vriescoupe diagnostiek gedurende laparotomie voor een ovariumtumor, die klinisch verdenking geeft op maligniteit, kan de patient een tweede operatie voor stagering besparen.
6. Preoperatieve serum "sampling" van patienten, die voor een maligne ovarium tumor worden geopereerd, is noodzakelijk.
7. De veronderstelling dat elke tumor gelokaliseerd buiten het als primair beschouwde gezwel een metastase is, is niet houdbaar.
8. Alvorens een biopsie te nemen ten behoeve van histopathologische diagnostiek dient klinisch een duidelijke, wel overwogen differentiële diagnose te worden opgesteld, met een uiteindelijke diagnose.

9. Indien er klinisch sprake is van een nasopharynx tumor, dan dient er met de mogelijkheid van een doorgewoekerde hypofyse-tumor rekening te worden gehouden.
10. Behalve met de bekende oorzaken van postmenopausaal bloedverlies, dient ook met de mogelijkheid van "Malakoplakie van het Endometrium" rekening te worden gehouden.
- Chadha; Vuzevski en Ten Kate
Europ. J. Obstet. Gynec. reprod. Biol.
(1985) 20: 181-189.
11. "Every great advance in science has issued from a new audacity of imagination".
- John Dewey
The Quest for Certainty
12. "If you work for a man, in heaven's name work for him! If he pays you wages that supply you your bread and butter work for him, speak well of him, think well of him, stand by him and stand by the institution he represents".

Elbert Hubbard

Rotterdam, 12 Juni 1987

S. Chadha