

STELLINGEN

1. De tijdsduur van een ^{99m}Tc -DTPA nierscan onder condities van maximale diurese kan van 45 minuten tot 7 minuten worden teruggebracht. (Dit proefschrift).
2. De indicatie voor het verrichten van pressure-flow studies ter onderscheiding van obstructieve en niet-obstructieve uropathie is nauwelijks of niet aanwezig gezien de resultaten van de niet-invasieve renografie tijdens maximale diurese.
(Dit proefschrift).
3. Voor de follow-up van patiënten met obstructieve uropathie is een gestandaardiseerde methode zoals de renografie onder maximale diurese noodzakelijk. (Dit proefschrift).
4. Bij het oudere kind met een urineweginfectie neemt het cystogram in het onderzoeksschema een ondergeschikte plaats in.
(Cavanagh PM, British Journal of Urology 1983;55:217-219.
Bakker NJ, Griffiths DJ, Scholtmeijer RJ: Letter to the editor
Urology 1985;25:98-99)
5. Bij niet of nauwelijks functionerende hydronephrotische nieren bij kinderen dient drainage via nephrostomie plaats te vinden (gedurende 6 weken) alvorens besloten wordt tot operatieve correctie of nephrectomie.
(van Gooswilligen JC: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1984;128:119-121)
6. D-desamino-8-arginine-vasopressine (DDAVP) verdient een belangrijke plaats in het behandelingspakket bij oudere kinderen met enuresis nocturna.
(Tuvemo T: DDVAP in childhood nocturnal enuresis. Acta Paediatrica Scandinavica 1978;67:753-755)
7. Vele doden door astma zijn het gevolg van niet adequate - of te laat ingestelde therapie en moeten derhalve als "mogelijk-te-voorkomen-zijn-geweest" worden beschouwd.
(Benatar SR: New England Journal of Medicine 1986;314:423-429)

8. Het is zelden nodig een gastro-enteritis bij het kind medicamenteus te behandelen.
9. Tijdens de vorming tot arts dient aandacht besteed te worden aan de vorming van het "zelf". Immers wil men een ander kunnen helpen dan dient men "standvastig" te zijn.
10. Het is verbijsteringwekkend te zien hoeveel gezichten de(zelfde) politiek lijkt te hebben.
11. De wereldvrede wordt door niet-politici in stand gehouden.
12. Het steeds luider praten tegen buitenlandse patiënten en hun ouders berust op een misinterpretatie; de patiënt is niet doof, maar er bestaat een taalbarrière. (Praktijkervaring).
13. Voor bepaalde vormen van wetenschappelijk onderzoek is een perifere kinderkliniek beter geschikt dan een academische kinderkliniek.
14. "Hij, die handelingen (slechts) om Mij verricht, Mij als de allerhoogste aanneemt, Mij toegewijd, vrij van gehechtheid, niet vijandig staat tegenover alle schepselen, die bereikt Mij, O Pándava".
(Bhagavadgítá XI:55. Uit de Nederlandse vertaling van Prof. Dr. J.P. Kaulesar Sukul, proefschrift 1958).

Stellingen horend bij het
proefschrift van
R.N. Sukhai
Eilandenweg 36
2904 WJ Capelle a/d IJssel