

## STELLINGEN

Behorend bij het proefschrift van J.G.M. Klijn

1. De vaststelling van Cushing (1921): "It is certain that no one method (of treatment) is applicable for all conditions of the pituitary tumour" geldt nog steeds.
2. In tegenstelling tot bij patiënten met prolactinomen bestaat er een (negatieve) correlatie tussen leeftijd en grootte van de hypofysetumor bij patiënten met acromegalie.  
(Hoofdstuk IV)
3. Extrasellaire uitbreiding van hypofysetumoren en hypofysaire insufficiëntie treden voornamelijk op bij een tumorgrootte van meer dan 3 cm<sup>2</sup>.  
(Hoofdstuk III en IV)
4. Er bestaat een positieve correlatie tussen grootte van de rhyfpysetumor en de basale concentraties van prolactine en groeihormoon bij patiënten met respectievelijk prolactinomen en acromegalie.  
(Hoofdstuk II, III en IV)
5. Een afwezige of verlaagde respons van het thyreotroop hormoon (TSH) op stimulatie met "thyrotrophin-releasing hormone" (TRH) bij patiënten met acromegalie berust vrijwel altijd op suppressie van de thyreotrope cellen in de hypofyse en zelden op destructie van deze cellen.  
(Hoofdstuk VI)
6. Bij de behandeling van hypofysetumoren is de combinatie van tumorresectie en uitwendige bestraling effectiever dan elk van deze twee behandelingswijzen afzonderlijk.  
(Hoofdstuk II en VIII)
7. Chronische toediening van LHRH agonisten is een effectieve therapie bij patiënten met gemetastaseerd borst-en prostaatcancer.  
J.G.M. Klijn en F.H. de Jong, Lancet 1: 1213-1216, 1982.  
J.G.M. Klijn, H.J. de Voogt, F.H. Schröder en F.H. de Jong, Lancet 2: 493, 1985.
8. Somatostatine en analogen daarvan hebben onder bepaalde condities een direct remmend effect op de proliferatie van een menselijke borstkankercellijn (MCF-7).  
B. Setyono-Han, M.S. Henkelman, J.A. Foekens en J.G.M. Klijn, Cancer Research 47: 1566-1570, 1987.
9. De aanwezigheid en de concentratie van de progesteron-receptor gemeten in primaire mammatumoren hebben een grotere prognostische waarde dan die van de oestradiol-receptor.  
J. Alexieva-Figusch, W.L.J. van Putten, M.A. Blankenstein, J. Blonk-van der Wijst, en J.G.M. Klijn. Ingezonden voor publicatie, 1987.

10. Bij het schildkliercarcinoom zijn histologische classificatie, leeftijd, de zogenaamde TNM-status en vaatinfiltratie van elkaar onafhankelijke belangrijke prognostische factoren.  
A.C.M. Romme, W.L.J. van Putten, J. Alexieva-Figusch en J.G.M. Klijn.  
Ned. Tijdschr. Geneesk. 130: 731-736, 1986.
11. Alternatieve geneeskunde is niet zonder risico vooral wat betreft het gevaar van het onthouden van effectieve therapie.
12. In de geneeskunde leveren zorgen om de grenzen nog geen adequate grenzen van de zorg op.
13. Invoering in Nederland van het Amerikaanse "systeem" ter opsporing van door artsen gemaakte fouten zal de werkgelegenheid van advocaten bevorderen maar de gezondheidszorg helemaal onbetaalbaar maken.
14. Vliegtuigpassagiers die hun stoel in de achterste stand stellen zouden de helft van het ticket van de passagier achter hen moeten betalen.
15. De suggestie om voetbalwedstrijden te verbieden omdat zij vandalisme uitlokken, is te vergelijken met een verbod op de verkoop van fietsen omdat er zoveel fietsen gestolen of vernield worden.

Rotterdam, 19 juni 1987