

STELLINGEN

- 1) AEDS en allergisch astma gaan vrijwel altijd samen met allergische rhinitis (dit proefschrift)
- 2) Mijtwerende hoezen zorgen voor significante reductie van Der p1 en Der f1 in het stof van matrassen (dit proefschrift)
- 3) Mijtwerende hoezen hebben als solo maatregel geen effect op klachten van allergische rhinitis (dit proefschrift)
- 4) Patiënten met alleen rhinitis hebben meer klachten van hun neus dan patiënten die tevens astma of AEDS hebben (dit proefschrift)
- 5) Bij het doen van onderzoek naar kwaliteit van leven bij allergische patiënten is het wenselijk zowel generieke als ziektespecifieke vragenlijsten af te nemen (dit proefschrift)
- 6) Atopie overschrijdt de grenzen der specialismen
- 7) Behandeling van allergische rhinitis met capsaïcine is niet effectief
Gerth Van Wijk R, Terreehorst I, Mulder PG, Garrelds IM, Blom HM, Popering S. Intranasal capsaicin is lacking therapeutic effect in perennial allergic rhinitis to house dust mite. A placebo-controlled study. *Clin Exp Allergy* 2000;30:1792-8.
- 8) Laat het leven sober zijn, maar vol van kleine feestjes (J. Bezemer)
- 9) Het drinken van paardenmelk ter behandeling van eczeem kan bij patiënten met een allergie voor paardendander leiden tot levensbedreigende reacties (Terreehorst I, Broodman I, Paardenmelk, een gezond alternatief?, article submitted)
- 10) Bij onvoldoende resultaat met conventionele therapie bij mastocytose kan Gleevec (Imatinib) een goede aanvulling zijn (PLA van Daele, Second Congres of the NECM, 15 mei 2004)
- 11) Het niet strikt naleven van veiligheidsprocedures in een laboratorium kan leiden tot introductie van gevaarlijke pathogenen in de samenleving zoals SARS en polio.
Heymann DL, Aylward RB, Wolff C. Dangerous pathogens in the laboratory: from smallpox to today's SARS setbacks and tomorrow's polio-free world. *Lancet* 2004;363:1566-8.