

STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift

DRUGS, QTc PROLONGATION AND SUDDEN CARDIAC DEATH

- 1 The incidence of SCD in the general Dutch population is approximately 1 per 1000 person- years. (dit proefschrift)
- 2 Drug-associated QTc prolongation is common in a population of community dwelling elderly. (dit proefschrift)
- 3 Abnormal QTc prolongation on the ECG should be viewed as an independent risk factor for sudden cardiac death. (dit proefschrift)
- 4 Current use of antipsychotics in a general population is associated with an increased risk of sudden cardiac death also in persons who use antipsychotics for other indications than schizophrenia. (dit proefschrift)
- 5 In the Netherlands, approximately 300 cases of sudden cardiac death can be attributed to the use of non-cardiac QTc prolonging medication each year. (dit proefschrift)
- 6 Van schrik kun je dood gaan. (NEJM 2005 352;6:539-48 ILAN WEITSTEIN ET AL)
- 7 De organisatie van farmacovigilantie zou gebaat zijn bij de adviezen van Von Clausewitz.
- 8 Van het overheidsbeleid om het gebruik van externe defibrillatoren in openbare plaatsen aan te moedigen, is weinig effect te verwachten.
- 9 Promoveren op latere leeftijd is een manier om je 'product life cycle' te verlengen.
- 10 De preventie van acute hartdood zou vooral gericht moeten zijn op het voorkomen van te vroege acute hartdood.
- 11 Vrouwen hebben twee wapens: make-up en tranen. (Napoleon)

Sabine Straus, Rotterdam, 14 september 2005

