

Optimizing Surveillance in Barrett's Esophagus

From Chemoprevention and Biomarkers to Cost-effectiveness and Survival

1. Gebruik van proton pomp remmers geeft niet alleen verlichting van klachten, maar verlaagt ook het risico op het ontwikkelen van een adenocarcinoom bij patiënten met een Barrett slokdarm. *Dit proefschrift*
2. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) en statines hebben een chemopreventief effect bij patiënten met een Barrett slokdarm. *Dit proefschrift*
3. Afwijkende expressie van de biomarker p53 is een betere voorspeller voor het ontwikkelen van hooggradige dysplasie of adenocarcinoom in Barrett slokdarm dan diagnose van laaggradige dysplasie. *Dit proefschrift*
4. De kosteneffectiviteit van Barrett surveillance is vooral afhankelijk van de kans op progressie naar hooggradige dysplasie of adenocarcinoom. *Dit proefschrift*
5. Barrett surveillance leidt tot vroegtijdige opsporing van adenocarcinomen van de slokdarm met een 5-jaars overleving van 74%. *Dit proefschrift*
6. Preoperatieve chemoradiotherapie verbetert de overleving van patiënten met een potentieel curabel slokdarmcarcinoom. *van Hagen NEJM 2012*
7. Darmkankerscreening met behulp van colonoscopie leidt tot een afname van sterfte ten gevolge van darmkanker. *Nishihara NEJM 2013*
8. Verstoring van de slaap is geassocieerd met een verhoogd risico op exacerbaties bij patiënten met de ziekte van Crohn. *Ananthkrishnan Clinical Gastroenterology and Hepatology 2013*
9. Promovendi hebben een grote kans om te trouwen vlak voor of na het behalen van hun doctoraat. *Fey the Lancet 2011*
10. Aangezien het eten van chocolade geassocieerd is met verbetering van de cognitie en het winnen van de Nobelprijs, is het een onmisbaar ingrediënt bij het schrijven van een proefschrift. *Messerli NEJM 2012*
11. Het is niet aanleg maar doorzettingsvermogen dat respect verdient.