

Stellingen behorende bij het proefschrift
“Long-term outcome after cardiac stress imaging”

1. Een normale perfusie, vastgesteld met SPECT myocardperfusiescintigrafie, is van grote prognostische waarde bij patiënten met coronairlijden of een vermoeden daarop. *(dit proefschrift)*
2. De ‘geldigheidsduur’ van dobutamine SPECT myocardperfusiescintigrafie bij patiënten met diabetes mellitus is 4jaar. Na die periode is het, afhankelijk van de klinische presentatie van de patiënt, nodig om de scan te herhalen. *(dit proefschrift)*
3. Informatie over ischemie op dobutamine stress echocardiografie is voorspellend voor sterfte. *(dit proefschrift)*
4. De prognostische waarde van dobutamine stress echocardiografie doet niet onder voor die van dobutamine SPECT myocardperfusiescintigrafie. *(dit proefschrift)*
5. Patiënten met matige tot ernstige ischemie op dobutamine SPECT myocardperfusiescintigrafie hebben lange-termijn voordeel van vroege coronaire revascularisatie. *(dit proefschrift)*
6. Bij patiënten met een transfusiereactie dient de oorzaak altijd achterhaald te worden.
7. Onderzoekers zouden in publicaties ook meer niet-significante resultaten moeten noemen.
8. De streef bloeddruk van patiënten met hypertensie en een verhoogd cardiovasculair risico profiel, maar zonder diabetes mellitus, dient onder de 120 mmHg te zijn.
9. De neus als diagnostisch instrument is veelbelovend ten opzichte van conventionele technieken. *(Naar: Bomers et al., Ned Tijdschr Geneeskde, 2015).*
10. Medisch-wetenschappelijke tijdschriften dienen een identieke referentie stijl te hanteren.
11. Er is geen lof verschuldigd aan hem die simpelweg zijn taak uitvoert. *(Augustinus)*

Hendrik Johannes Boiten