

Optimization Strategies for Laser Therapy in Dermatology

Karin Greveling

1. De toevoeging van topicaal sirolimus aan de Pulsed Dye Laser behandeling van wijnvlekken heeft geen bewezen positief effect.
Dit proefschrift
2. 7% lidocaine-tetracaine crème is niet superieur aan 2.5% lidocaine-prilocaine crème onder occlusie als lokale pijnstiller tijdens de laserbehandeling van dermaal gelegen chromoforen.
Dit proefschrift
3. De incidentie van lentigo maligna (LM) en lentigo maligna melanoom (LMM) in Nederland is de afgelopen 25 jaar sterk gestegen, met in de meest recente periode een jaarlijkse stijging van 7% voor LM en 12% voor LMM.
Dit proefschrift
4. De patiënttevredenheid betreffende het esthetisch resultaat na de behandeling van lentigo maligna met de ablatieve laser en imiquimod crème is hoog.
Dit proefschrift
5. Bij lentigo maligna op de neus bevinden de atypische melanocyten zich dieper in de haarfollikels dan bij lentigo maligna op de wang, hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor de hogere recidief kans op de neus na niet-chirurgische behandeling.
Dit proefschrift
6. Absence of evidence is not evidence of absence.
Altman and Bland, BMJ 1995
7. When evaluating the validity of a study, both the clinical and statistical significance of the findings must be considered.
Bhardwaj et al., Arch Dermatol 2004
8. Studies reporting positive results are more likely to be published, which may lead to an overestimation of treatment effects.
Dwan et al., PLoS One 2008
9. The literature of head-to-head RCTs is dominated by the industry, and systematically yields favourable results for the sponsors.
Flacco et al., J Clin Epidemiol 2015
10. Face-to-face communication and in-person meetings can boost efficiency.
Jiang et al., J Neurosci 2012
11. Om je doel te bereiken moet je – soms letterlijk – je grenzen verleggen.