

Reducing Harms and Increasing Benefits of Screening for Cervical Cancer and Colorectal Cancer – A Model-based Approach

1. Bij vrouwen die jaarlijks of tweejaarlijks een uitstrijkje laten maken kan beter primair op celafwijkingen getest worden dan op HPV-status. *(Dit proefschrift)*
2. Baarmoederhalskankerscreening onder leeftijd 30 is weinig effectief, en leidt bovendien tot een beduidend hogere kans op vroeggeboorte. *(Dit proefschrift)*
3. Dunnelaag cytologie testen SurePath en ThinPrep zijn niet identiek, en dienen niet als zodanig behandeld te worden. *(Dit proefschrift)*
4. Voor individuen met een positieve familieanamnese van darmkanker zou de aanbevolen frequentie van screening afhankelijk moeten worden van leeftijd. *(Dit proefschrift)*
5. De huidige kennis over de relatie tussen veelvoorkomende genetische varianten en het risico op darmkanker is te beperkt om screening op basis van polygenetisch risico in te voeren. *(Dit proefschrift)*
6. De meeste mensen die een behandeling, screening of test ondergaan onderschatten de schadelijke effecten en overschatten de gunstige effecten daarvan. *(Hoffmann en Del Mar, 2015, JAMA Int Med)*
7. Een hoge mate van erfelijkheid sluit de mogelijkheid voor een effectieve preventiemaatregel niet uit. *(Mucci et al., 2016, JAMA)*
8. In landen met een overvloed aan voedsel kan een dieetwijziging ervoor zorgen dat de voor de voedselproductie gebruikte oppervlakte en de daarbij vrijkomende CO₂ uitstoot tot 50% wordt teruggedrongen. *(Hallström et al., 2015, J Clean Prod)*
9. De voortdurende vergelijking met anderen zou in veel domeinen van het leven beperkt moeten worden, omdat het mensen ervan weerhoudt tevreden te zijn met hetgeen dat zij (bereikt) hebben. *(Binswanger, 2006, J Soc Economics)*
10. Ervaringen leiden tot meer geluk dan materiële aankopen. *(Van Boven, 2003, J Pers Soc Psych)*
11. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. *(Cameron, 1963)*