

Optimizing TB treatment

1. Thioridazine is in vitro actief tegen *Mycobacterium tuberculosis*, maar het kan niet beschouwd worden als veilig en effectief een geneesmiddel tegen tuberculosis (dit proefschrift)
2. De combinatie van moxifloxacin en linezolid lijkt een potentiële therapie voor multidrug resistente (MDR)-TB (dit proefschrift)
3. Het gebruik van verschillende *Mycobacterium tuberculosis* stammen in preklinisch onderzoek verhoogt de voorspellende waarde daarvan (dit proefschrift)
4. De relapse bepaling is mogelijk de belangrijkste parameter van het in vivo TB onderzoek, maar wordt momenteel niet optimaal toegepast (dit proefschrift)
5. Met het tellen van het aantal kolonies op een plaat als gouden standaard voor de mycobacteriële load wordt de ‘slapende’ subpopulatie mycobacteriën gemist (dit proefschrift)
6. Het is ongefundeerd en gevaarlijk dat de WHO *Mycobacterium tuberculosis* niet op lijst van “antibiotic-resistant priority pathogens” heeft gezet (IUTLD, 2017)
7. De druk om in Q1 tijdschriften te publiceren leidt niet tot kwalitatief beter onderzoek, eerder tot verschraving van het onderzoek (Excellence by Nonsense: The Competition for Publications in Modern Science, 2013)
8. De noodzaak om snel te reageren op gevaarlijke situaties in het verkeer kan verklaren dat dagelijks motorrijden een gunstig effect heeft op het ruimtelijk inzicht (IJAE, 2014, (5): 73-76)
9. Ont-ontwikkelen: “het bij het grofvuil zetten van kennis, technologie en geneesmiddelen omdat kwakzalvers en bezorgde burgers zogenaamd onderzoek doen op Facebook” is een zorgwekkende trend (NRC, 2016)
10. Het werken in zogenaamde kantoortuinen heeft een negatieve invloed op de productiviteit (Int. Rev. Ind. Organ. Psychol, 2011 (26): 193-237)
11. Er zijn 2 groepen motorrijders: zij die al zijn gevallen en zij die nog gaan vallen.